



Kokeessa saa vastata enintään kymmeneen tehtävään. Eräät tehtävät sisältävät useita osia [merkittynä **a**), **b**) jne.], jolloin kaikkien kohtien käsittely kuuluu tehtävän täydelliseen suoritukseen.

1. Ratkaise yhtälö

$$\frac{1}{x} - \frac{x}{x+3} = 0.$$

2. Määritä käyrän $y = x^3$ pisteeseen $(2, 8)$ piirretyn tangentin yhtälö. Missä pisteessä tangentti leikkaa y -akselin? Määritä tangentin, y -akselin ja suoran $y = 8$ määräämän kolmion pinta-ala.

3. Vektorit \vec{a} ja \vec{b} ovat vastakkaisuuntaiset. Olkoon $\vec{a} = \frac{3}{2}\vec{i} - 2\vec{j}$ ja olkoon vektorin \vec{b} pituus 5. Määritä \vec{b} . Mikä on loppupiste, kun \vec{b} asetetaan alkamaan pisteestä $(4, 3)$?

4. Säiliö sisältää 2,3 kg ilmaa, ja pumppu poistaa jokaisella vedolla 5 % säiliössä olevasta ilmasta. Kunka monen vedon jälkeen säiliössä on vähemmän kuin 0,2 kg ilmaa?

5. Suoran ympyräkartion muotoisen jäätelötuutin korkeus on $h = 16$ cm ja yläosan (kartion pohjan) halkaisija $d = 6$ cm. Tuutin ympärille kartion vaipaksi kierretään ympyränsektorin muotoinen suojapaperi. Laske sektorin säde r ja keskuskulma α , kun suojapaperi on kaikkialla yksinkertainen (myöskään liimausvaraa ei oteta huomioon). Vastaukset yhden millimetrin ja yhden asteen tarkkuudella.

6. Määritä funktion

$$f(x) = \frac{5}{4 + 3 \cos 2x}$$

suurin ja pienin arvo reaalilukujen joukossa. Millä argumentin arvoilla nämä saadaan?

7. Tutkimuksessa todettiin, että 200 gramman keksipakkausten massan keskiarvo oli 204 g ja keskihajonta 6 g. Oletetaan, että massa on normaalisti jakautunut. Kuinka monella prosentilla pakkauksista massa oli alle 200 g? Kuinka monella prosentilla pakkauksista massa oli välillä 200 g – 210 g?

8. Suorakulmaisen kolmion kaikki kärjet sijaitsevat paraabelilla $y = x^2$; suoran kulman kärki on paraabelin huipussa. Osoita, että jokaisen tällaisen kolmion hypotenuusa leikkaa paraabelin akselin samassa pisteessä. Määritä tämä piste.

9. Funktio f on määritelty välillä $0 \leq x \leq 2$ seuraavasti:

$$f(x) = \int_0^1 |x - t| dt.$$

Määritä funktion suurin ja pienin arvo välillä $[0, 2]$. Piirrä kuvaaja.

KÄÄNNÄ!

- 10.** Funktiota $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sanotaan *parittomaksi*, jos $f(-x) = -f(x)$ jokaisella reaaliluvulla x . Anna esimerkki parittomasta funktiosta, joka on kasvava \mathbb{R} :ssä, ja parittomasta funktiosta, joka ei ole kasvava \mathbb{R} :ssä. Osoita, että $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, jos f on pariton ja jatkuva.
- 11.** Pallon sisään asetetaan kuutio, jonka kärjet ovat pallon pinnalla. Kuution sisään asetetaan pallo, joka sivuaa jokaista kuution sivutahkoa. Tämän sisään asetetaan jälleen kuutio jne. Osoita, että pallojen **a)** säteet, **b)** pinta-alat ja **c)** tilavuudet kukin erikseen muodostavat geometrisen jonon. Määritä jonojen suhdeluvut.
- 12.** Lukujärjestelmän kantaluku on 7. Lausu tämän järjestelmän luvut 11, 111 ja 1111 kymmenjärjestelmässä. Miten kymmenjärjestelmän luvut 11, 111 ja 1111 esitetään tässä järjestelmässä?
- 13.** Lukujonon termit ovat $x_1 = 1, x_2 = \sqrt{2}, x_3 = \sqrt{2\sqrt{2}}, x_4 = \sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2}}}$ jne. Muodosta termeille rekursiokaava. Laske $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.
- 14.** Miten määritellään kompleksiluvun $z = x + iy$ liittoluku \bar{z} ? Osoita määritelmän perusteella, että kahden kompleksiluvun z_1 ja z_2 tulolle pätee $\overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2$. Ratkaise yhtälö $z^2 + \bar{z} + 1 = 0$.
- 15.** Lohenviljelyaltaaseen, jossa oli 1 100 kalaa, levisi kalatauti. Taudin vaikutuksesta kalamäärä alkoi vähetä yhtälön

$$P'(t) = -4\sqrt{P(t)}$$

mukaisesti. Tässä $P(t)$ on kalamäärä hetkellä t , ja aika t on mitattu viikkoina. Kuinka monen viikon kuluttua kaikki kalat olivat kuolleet?