

Pitkä matematiikka 30.9.2005, ratkaisut:

1. a) $2(x - 1) + 3(x + 1) = -x \iff 6x = -1 \iff x = -\frac{1}{6}$.

b) $x + 2 = \frac{1}{x - 2} \iff x^2 - 4 = 1 \iff x = \pm\sqrt{5}$.

c) $x^{16} = 256 = 2^8 \iff x^2 = 2 \iff x = \pm\sqrt{2}$.

Vastaus: a) $x = -\frac{1}{6}$, b) $x = \pm\sqrt{5}$, c) $x = \pm\sqrt{2}$.

2. a) Jos hypotenuusan pituus on x , niin $x^2 = 6^2 + 4^2 = 52$, joten $x = 2\sqrt{13} \approx 7,2111$.

b) Jos kolmion terävät kulmat ovat α ja β , niin $\tan \alpha = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$, josta $\alpha \approx 33,6901^\circ$ ja $\beta = 90^\circ - \alpha \approx 56,3099^\circ$.

c) Kolmion ala on $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 6 = 12$.

Vastaus: a) $2\sqrt{13} \approx 7,21$, b) $33,69^\circ$ ja $56,31^\circ$, c) 12 .

3. Vektori $\overline{AB} = (7 - 3)\vec{i} + (3 - 1)\vec{j} = 4\vec{i} + 2\vec{j}$ ja $\overline{CD} = (-3 - 1)\vec{i} + (-2 - 4)\vec{j} = -4\vec{i} - 6\vec{j}$.

Jos vektorien välinen kulma on α , on $\cos \alpha = \frac{\overline{AB} \cdot \overline{CD}}{|\overline{AB}| |\overline{CD}|} = -\frac{28}{\sqrt{20}\sqrt{52}} = -\frac{7}{\sqrt{65}} \approx -0,868243$, josta $\alpha \approx 150,25512^\circ$.

Vastaus: Kulma on $150,3^\circ$.

4. Funktion kuvaaja on alaspäin aukeava paraabeli. Funktio saa siten vain negatiivisia arvoja, jos paraabelin huippu on x -akselin alapuolella. Koska $f'(x) = -2x + a = 0$, kun $x = \frac{1}{2}a$, on huipun x -koordinaatti $\frac{1}{2}a$. On siis oltava $f(\frac{1}{2}a) = \frac{1}{4}a^2 + a - 3 < 0$. Koska $\frac{1}{4}a^2 + a - 3 = 0$, kun $a = -6$ tai $a = 2$, on $f(\frac{1}{2}a) < 0$, kun $-6 < a < 2$.

Vastaus: Arvoilla $-6 < a < 2$.

5. Jos alussa puun korkeus on h_1 ja tyven halkaisija d_1 , on puun alkutilavuus $V_1 = \frac{1}{3}\pi(\frac{1}{2}d_1)^2h_1$. Kahdenkymmenen vuoden kuluttua puun korkeus $h_2 = \frac{7}{6}h_1$, tyven halkaisija $d_2 = \frac{4}{3}d_1$ ja tilavuus $V_2 = \frac{1}{3}\pi(\frac{2}{3}d_1)^2(\frac{7}{6}h_1) = \frac{56}{27}V_1$. Tilavuuden prosentuaalinen kasvu on $100(\frac{V_2}{V_1} - 1) = 100(\frac{56}{27} - 1) = 100 \cdot \frac{29}{27} \approx 107,407$.

Vastaus: Tilavuus kasvaa $107,4\%$.

6. Ympyrän ja suoran $y = x - a$ leikkauspisteiden x -koordinaatit toteuttavat yhtälön $x^2 + (x - a)^2 = a^2$ eli $2x(x - a) = 0$, jonka ratkaisu on $x = 0$ tai $x = a$. Leikkauspisteet ovat siis $A = (0, -a)$ ja $B = (a, 0)$. Nämä ovat sen janan päätepisteet, jolla suora jakaa ympyrän kahteen osaan. Pienempi osa on kalotti, joka saadaan poistamalla neljännesympyrästä kolmio OAB (O on origo). Kalotti on 4. neljänneksessä, jos $a > 0$ ja 2. neljänneksessä, jos $a < 0$. Kalotin ala on $\frac{1}{4}\pi a^2 - \frac{1}{2}a^2$ ja loppuympyrän

$\frac{3}{4}\pi a^2 + \frac{1}{2}a^2$. Alojen suhde on siten $\frac{\frac{1}{4}\pi a^2 - \frac{1}{2}a^2}{\frac{3}{4}\pi a^2 + \frac{1}{2}a^2} = \frac{\pi - 2}{3\pi + 2} \approx 0,099923$.

Vastaus: Suhde on $\frac{\pi - 2}{3\pi + 2} \approx 0,100$.

7. Funktion f derivaatta $f'(x) = \frac{2x(1 - x^4)}{(x^4 + x^2 + 1)^2}$. Kun $x > 1$, on $2x(1 - x^4) < 0$ ja $(x^4 + x^2 + 1)^2 > 0$ eli $f'(x) < 0$. Näin ollen funktio on aidosti vähenevä, kun $x > 1$. Koska $1 < a < b$, on oltava $f(a) > f(b)$.

Vastaus: $f(a)$ on suurempi.

8. Kuoria on yhteensä 16. Niistä voidaan valita kaksi $\binom{16}{2} = 120$ eri tavalla. Valintoja, joissa tulee kaksi samanväristä on ruskean tapauksessa $\binom{2}{2} = 1$, mustan $\binom{6}{2} = 15$ ja sinisen $\binom{8}{2} = 28$ eli yhteensä $1 + 15 + 28 = 44$. Kuoret ovat siten samanväriset todennäköisyydellä $\frac{44}{120} = \frac{11}{30} \approx 0,3667$.

Vastaus: Todennäköisyydellä $\frac{11}{30}$.

9. Olkoon laskevan suoran yhtälö $y - 4 = k(x - 3)$. Suora leikkaa y -akselia pisteessä $y_0 = 4 - 3k$ ja x -akselia pisteessä $x_0 = 3 - \frac{4}{k}$. Suoran ja koordinaattiakselien rajoittaman kolmion ala on $\frac{1}{2}x_0y_0$ eli k :n funktiona $f(k) = \frac{1}{2}(3 - \frac{4}{k})(4 - 3k) = \frac{1}{2}(24 - 9k - \frac{16}{k})$. Derivaatta $f'(k) = \frac{1}{2}(-9 + \frac{16}{k^2}) = 0$, kun $k^2 = \frac{16}{9}$ eli $k = \pm\frac{4}{3}$. Koska suora on laskeva, on $k = -\frac{4}{3}$. Koska $f'(k) < 0$, kun $k < -\frac{4}{3}$ ja $f'(k) > 0$, kun $0 > k > -\frac{4}{3}$, on kyseessä minimikohta. Vastaava funktion arvo on $f(-\frac{4}{3}) = \frac{1}{2}(3 + 3)(4 + 4) = 24$.

Vastaus: Kulmakerroin on $-\frac{4}{3}$ ja vastaava pienin ala 24.

10. Koska $a_1 = \frac{1 + 0 \cdot 3}{1 + 1}$, $a_2 = \frac{1 + 1 \cdot 3}{2 + 1}$, $a_3 = \frac{1 + 2 \cdot 3}{3 + 1}$, $a_4 = \frac{1 + 3 \cdot 3}{4 + 1}$, ja $a_5 = \frac{1 + 4 \cdot 3}{5 + 1}$, on oltava $a_n = \frac{1 + (n - 1) \cdot 3}{n + 1} = \frac{3n - 2}{n + 1}$. Kun $n \rightarrow \infty$, niin $a_n = \frac{3 - \frac{2}{n}}{1 + \frac{1}{n}} \rightarrow 3$.

Koska $a_{n+1} - a_n = \frac{5}{(n+1)(n+2)} > 0$, on jono nouseva. Näin ollen $|a_n - 3| < 0,001$, kun $3 - \frac{3n - 2}{n + 1} < 0,001 \iff \frac{5}{n + 1} < 0,001 \iff n > 4999$ eli arvosta $n = 5000$ alkaen.

11. Yhtälö on määritelty, kun $x > 0$. Merkitään $f(x) = x - 2 \ln x$. Derivaatta $f'(x) = 1 - \frac{2}{x} = 0$, kun $x = 2$. Kun $0 < x < 2$, on $f'(x) < 0$ ja kun $x > 2$, on $f'(x) > 0$, joten f saa pienimmän arvonsa kohdassa $x = 2$. Edelleen $f(2) = 2 - 2 \ln 2 > 0,6 > 0$. Näin ollen $x - 2 \ln x > 0$ kaikilla arvoilla x , joilla se on määritelty, joten yhtälöllä $x - 2 \ln x = 0$ ei ole reaali juuria.

12. Alueen ensimmäisessä ja kolmannessa koordinaattineljänneksessä olevat osat ovat symmetriset, joten riittää määrätä ensimmäisessä neljänneksessä olevan ala. Suorat $y = 2x$ ja $y = \frac{1}{2}x$ kulkevat origon O kautta ja leikkaavat hyperbeliä $xy = 1$ pisteissä $A = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \sqrt{2})$ ja $B = (\sqrt{2}, \frac{1}{\sqrt{2}})$. Tällöin 1. neljänneksessä oleva ala on $\int_0^{1/\sqrt{2}} (2x - \frac{1}{2}x)dx + \int_{1/\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} (\frac{1}{x} - \frac{1}{2}x)dx = \int_0^{1/\sqrt{2}} \frac{3}{4}x^2 + \int_{1/\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} (\ln x - \frac{1}{4}x^2) = \frac{3}{8} + 2 \ln \sqrt{2} - \frac{3}{8} = \ln 2$. Näin ollen kysytty ala on $2 \ln 2 \approx 1,3863$.

Vastaus: Ala on $2 \ln 2$.

13. a) Merkitään $x_n = \frac{\pi}{3} + 10^{-3n}$, $n = 1, 2, 3, 4, 5$. Eräs laskin antaa lausekkeelle arvot $L(x_1) = 4,006942$, $L(x_2) = 3,99998$, $L(x_3) = 3,98$, $L(x_4) = 0$, $L(x_5) = 0$.

b) Koska $\tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$, on $L(x) = \frac{\tan x - \tan \frac{\pi}{3}}{x - \frac{\pi}{3}}$ eli on funktion $f(x) = \tan x$ erotusosamäärä pisteessä $x = \frac{\pi}{3}$. Funktio $f(x)$ on derivoituva tässä pisteessä, joten on olemassa $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} L(x) = f'(\frac{\pi}{3}) = (\cos \frac{\pi}{3})^{-2} = 4$. Edellä a-kohdassa muodostetun jonon pitäisi tämän perusteella samoin lähestyä arvoa neljä. Funktion $L(x)$ lauseke sopii kuitenkin huonosti numeeriseen laskentaan, joten näin ei kuitenkaan tapahtunut käytetyn laskimen tarkkuudella lasketuille arvoille.

14. Olkoon käyrän yhtälö $y = y(x)$. Pisteeseen $(x_0, y(x_0))$ asetetun tangentin yhtälö on $y - y(x_0) = y'(x_0)(x - x_0)$. Jotta tehtävän ehto toteutuisi, on tangentin leikattava x -akselia pisteessä $(2x_0, 0)$. On siis oltava $0 - y(x_0) = y'(x_0)(2x_0 - x_0)$ eli $y(x_0) = y'(x_0) \cdot x_0$. Tästä saadaan differentiaaliyhtälö $\frac{y'}{y} = -\frac{1}{x}$ eli $\frac{dy}{y} = -\frac{dx}{x}$. Siitä voidaan ratkaista y suoraan integroimalla. Saadaan $\ln |y(x)| = -\ln |x| + c'$ eli $y(x) = \frac{c}{x}$.

Vastaus: Käyrien yhtälöt ovat muotoa $y = \frac{c}{x}$.

15. a) Jos jakojäännös on r , on 2^{345} muotoa $5a + r$ eli $2^{345} = r \pmod{5}$. Edelleen, koska $4 = -1 \pmod{5}$, on $2^{345} = 2 \cdot 2^{344} = 2 \cdot 4^{172} = 2 \cdot (-1)^{172} = 2 \pmod{5}$. Siis $r = 2$.

b) Jos jakojäännös on r , on 3^{4567} muotoa $6a + r$ eli 3^{4566} on muotoa $2a + \frac{1}{3}r$. Siis $3^{4566} = \frac{1}{3}r \pmod{2}$. Edelleen, koska $3 = 1 \pmod{2}$, on $3^{4566} = 1^{4566} = 1 \pmod{2}$. Siis $\frac{1}{3}r = 1$ eli $r = 3$.

Vastaus: Jakojäännös on a-kohdassa 2 ja b-kohdassa 3.