

Tehtävä 1

$$\text{solve}\left(\frac{2}{x} - \frac{3}{x-2} = 0, x\right) \quad x=4$$

---

$$\text{solve}(x^2 - 2 \leq x, x) \quad -1 \leq x \leq 2$$

---

$$\text{solve}\left(\left|\frac{3}{2} \cdot x - 6\right| = 6, x\right) \quad x=0 \text{ or } x=8$$

---

{}

Vastaukset:

a)  $-4$

b)  $-1 \leq x \leq 2$

c)  $x = 0$  tai  $x = 8$

## Tehtävä 2

$a := 35.5$	35.5
$b := a + \frac{12}{100} \cdot a$	39.76
$c := b - \frac{10}{100} \cdot b$	35.784
$\frac{100 \cdot (c - a)}{a}$	0.8
$k := \frac{1 - 3}{-2 - 5}$	$\frac{-4}{7}$
$p := 5 \cdot \ln(2) - \ln(8)$	$2 \cdot \ln(2)$
$e^p$	4
{ }	

Vastaukset:

a) 0.8 %

b)  $-\frac{4}{7}$

c) 4

## Tehtävä 3

Define $f(x)=x \cdot e^{-x^2}$	<i>Valmis</i>
Define $g(x)=2 \cdot e^{-x^2}$	<i>Valmis</i>
solve( $f(x)=g(x),x$ )	$x=2$
$\frac{d}{dx}(f(x)) _{x=1}$	$-e^{-1}$
$\int_0^1 (f(x)) dx$	$\frac{1}{2} - \frac{e^{-1}}{2}$
$\square$	

Vastaukset:

a) 2

b)  $-\frac{1}{e}$

c)  $\frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{e}\right)$

## Tehtävä 4

Define $f(x)=2^x$	<i>Valmis</i>
Define $p(x)=a \cdot x^2 + b \cdot x + c$	<i>Valmis</i>
$yht: \Rightarrow f(x) = p(x)   x = \{ 0, 1, 2 \}$	$\{ 1=c, 2=a+b+c, 4=4 \cdot a+2 \cdot b+c \}$
$ratk: = solve(yht, \{ a, b, c \})$	$a = \frac{1}{2}$ and $b = \frac{1}{2}$ and $c = 1$
$p(x)   ratk$	$\frac{x^2}{2} + \frac{x}{2} + 1$
{ }	

Vaativalla että funktio  $2^x$  saa kyseisissä pisteissä samat arvot kuin polynomi

$ax^2+bx+c$  saadaan yhtälöryhmä

$$\begin{cases} 1=c \\ 2=a+b+c \\ 4=4a+2b+c \end{cases}$$

jonka ratkaisu on  $a=\frac{1}{2}$ ,  $b=\frac{1}{2}$ ,  $c=1$ . Polynomi on siis  $\frac{x^2}{2}+\frac{x}{2}+1$ .



## Tehtävä 5

Define $f(x) = x \cdot (x+3) \cdot (5-x)$	<i>Valmis</i>
$minkohta := fMin(f(x), x, -1, 5)$	$x=1$
$f(x) _{minkohta}$	-12
$maxkohta := fMax(f(x), x, -1, 5)$	$x=3$
$f(x) _{maxkohta}$	36
{ }	


Funktion suurimman ja pienimmän arvon kohta annetulla välillä saadaan funktioilla  $f_{\max}$  ja  $f_{\min}$ . Vastaavat funktion arvot saadaan sijoittamalla kohdat funktion lausekkeeseen. Vastaus: maksimi 36, minimi -12.

## Tehtävä 6

$p0 := \frac{nCr(3,0) \cdot nCr(7,3)}{nCr(10,3)}$	$\frac{7}{24}$
$p1 := \frac{nCr(3,1) \cdot nCr(7,2)}{nCr(10,3)}$	$\frac{21}{40}$
$p2 := \frac{nCr(3,2) \cdot nCr(7,1)}{nCr(10,3)}$	$\frac{7}{40}$
$p3 := \frac{nCr(3,3) \cdot nCr(7,0)}{nCr(10,3)}$	$\frac{1}{120}$
$p0 + p1 + p2 + p3$	1
$\{p0, p1, p2, p3\} \rightarrow \text{Decimal}$	$\{0.291667, 0.525, 0.175, 0.008333\}$
$\{ \}$	

Todennäköisyydet saadaan binomikertoimien avulla. Näiden summan tulee olla 1, kuten myös laskemalla todetaan. Todennäköisyyksien kolmidesimaaliset likiarvot: 0.292, 0.525, 0.175, 0.008.

Tehtävä 7



7.1

$a:=1$	1
$ehto:=a^2=x^2+x^2-2\cdot x\cdot x\cdot \cos(36^\circ)$	$1=\left(\frac{3}{2}-\frac{\sqrt{5}}{2}\right)\cdot x^2$
$ratk:=solve(ehto,x)$	$x=\frac{-\sqrt{5}}{2}-\frac{1}{2}$ or $x=\frac{\sqrt{5}}{2}+\frac{1}{2}$
$b:=\frac{\sqrt{5}}{2}+\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{5}}{2}+\frac{1}{2}$
$b \rightarrow \text{Decimal}$	1.61803
$leijanala:=a\cdot b\cdot \sin(72^\circ)$	$\frac{(\sqrt{5}+1)\cdot \sqrt{2}\cdot (\sqrt{5}+5)}{8}$
$leijanala \rightarrow \text{Decimal}$	1.53884
$nuolenala:=a\cdot b\cdot \sin(36^\circ)$	$\frac{(\sqrt{5}+1)\cdot \sqrt{2}\cdot (\sqrt{5}-5)}{8}$
$nuolenala \rightarrow \text{Decimal}$	0.951057
$\square$	

Kuvan mukaisesti kulmia laskemalla todetaan, että kuviot yhteen asetettuina muodostavat suunnikkaan, jonka vierekkäiset sivut symmetrian takia ovat yhtä pitkät. Kyseessä on siis neljäkäs. Neljäkkään sivun pituudeksi saadaan

kosinilauseesta ratkaisemalla  $\mathbf{b} = \frac{\sqrt{5}}{2} + \frac{1}{2} \approx 1.618$ . (Kuviossa yksikkönä on 1 dm.)

Laattojen pinta-alat saadaan sinilauseella: leija  $\frac{(\sqrt{5} + 1) \cdot \sqrt{2 \cdot (\sqrt{5} + 5)}}{8} \approx 1.539$  ja

nuoli  $\frac{(\sqrt{5} + 1) \cdot \sqrt{2 \cdot (\sqrt{5} - 5)}}{8} \approx 0.951$ .

## Tehtävä 8

$a := \{4, -5, 3\}$	$\{4, -5, 3\}$
$b := \{2, 1, -2\}$	$\{2, 1, -2\}$
$u := t \cdot b$	$\{2 \cdot t, t, -2 \cdot t\}$
$v := \{x, y, z\}$	$\{x, y, z\}$
$ehto1 := a = u + v$	$\{4 = 2 \cdot t + x, -5 = t + y, 3 = z - 2 \cdot t\}$
$ehto2 := \text{dotP}(v, b) = 0$	$2 \cdot x + y - 2 \cdot z = 0$
$ehdot := \{4 = 2 \cdot t + x, -5 = t + y, 3 = z - 2 \cdot t, 2 \cdot x + y - 2 \cdot z = 0\}$	$\{4 = 2 \cdot t + x, -5 = t + y, 3 = z - 2 \cdot t, 2 \cdot x + y - 2 \cdot z = 0\}$
$ratk := \text{solve}(ehdot, \{x, y, z, t\})$	$t = \frac{-1}{3}$ and $x = \frac{14}{3}$ and $y = \frac{-14}{3}$ and $z = \frac{7}{3}$
$\{u, v\}   ratk$	$\begin{bmatrix} \frac{-2}{3} & \frac{-1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{14}{3} & \frac{-14}{3} & \frac{7}{3} \end{bmatrix}$

[]



Kirjoittamalla vektori  $\mathbf{u}$  muotoon  $t\mathbf{b}$  ja pitämällä tuntemattomana vektoria  $\mathbf{v} = [x,y,z]$

saadaan ehdoista  $\mathbf{a} = \mathbf{u} + \mathbf{v}$  ja  $\mathbf{b} \cdot \mathbf{v} = 0$  yhtälöryhmä

$$\begin{cases} 4=2 \cdot t+x \\ -5=t+y \\ 3=z-2 \cdot t \\ 2 \cdot x+y-2 \cdot z=0 \end{cases}$$

Tämän ratkaisu on  $t=\frac{-1}{3}$ ,  $x=\frac{14}{3}$ ,  $y=\frac{-14}{3}$ ,  $z=\frac{7}{3}$ . Tällöin vektorit ovat

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} -2 & -1 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix} \text{ ja } \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 14 & -14 & 7 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix}.$$

Tehtävä 9

$$\text{when} \left( n > 1, \frac{-3}{4} \cdot a(n-1), \frac{5}{4} \right) \rightarrow a(n) \qquad \text{Valmis}$$

---


$$a(1) \qquad \qquad \qquad \frac{5}{4}$$

---


$$a(2) \qquad \qquad \qquad \frac{-15}{16}$$

---


$$a(10) \qquad \qquad \qquad \frac{-98415}{1048576}$$

---


$$a(100) \qquad \frac{-858962534553352218394101882942702121170179203335}{1606938044258990275541962092341162602522202993782792835301376}$$

---


$$\sum_{n=1}^{\infty} (a(n)) \qquad \qquad \qquad \text{"Virhe: Liian syvä rekursio"}$$

---


$$\text{Define } a(n) = \frac{5}{4} \cdot \left( \frac{-3}{4} \right)^{n-1} \qquad \qquad \qquad \text{Valmis}$$

---


$$\sum_{n=1}^{\infty} (a(n)) \qquad \qquad \qquad \frac{5}{7}$$

---

{}

Termit voidaan määrittellä rekursiokaavalla funktion when avulla. Yleisen termin lauseketta tai summaa ei tällöin kuitenkaan saada laskimella muodostetuksi.

Omien aivojen käyttö osoittaa, että kyseessä on geometrinen jono suhdelukuna

$q = -\frac{3}{4}$ , jolloin yleinen termi on  $a(n) = \frac{5}{4} \cdot \left(\frac{-3}{4}\right)^{n-1}$ . (Lihavointia en saanut pois!)

Tämän jälkeen onnistuu summeeraus ja tuloksena on  $\frac{5}{7}$ .

Tehtävä 10

Define  $g(x) = f(x) + \sin(x)$

*Valmis*

---

$$\int_0^{2\pi} (|f(x) - g(x)|) dx$$

---


4.

{}  
}

Suora integrointi, tuloksena 4.

## Tehtävä 11

Define $f(x) = \text{when}\left(x \leq -1, a \cdot x^2, \frac{x^2}{1+x^2}\right)$	<i>Valmis</i>
$\text{vasen} := \lim_{x \rightarrow -1^-} (f(x))$	$a$
$\text{oikea} := \lim_{x \rightarrow -1^+} (f(x))$	$\frac{1}{2}$
$\text{rk} := \text{solve}(\text{vasen} = \text{oikea}, a)$	$a = \frac{1}{2}$
Define $g(x) = f(x)   \text{rk}$	<i>Valmis</i>
$\text{dvas} := \lim_{h \rightarrow 0^-} \left( \frac{g(-1+h) - g(-1)}{h} \right)$	$-1$
$\text{doiik} := \lim_{h \rightarrow 0^+} \left( \frac{g(-1+h) - g(-1)}{h} \right)$	$\frac{-1}{2}$
}	



Määritellään funktio paloittain when-konstruktioilla ja lasketaan sen vasemman- ja oikeanpuolinen raja-arvo kohdassa  $x = -1$ . Jotta funktio olisi jatkuva, näiden

tulee olla yhtä suuret, jolloin saadaan  $a = \frac{1}{2}$ .

Sijoitetaan tämä arvo funktion lausekkeeseen. Saatu funktio on derivoituva muualla paitsi mahdollisesti kohdassa  $x = -1$ . Erotusosamäärän vasemman- ja oikeanpuolinen raja-arvo tässä kohdassa ovat eri suuret, joten funktio ei ole derivoituva.

Funktion  $f$  raja-arvo äärettömyydessä on 1.

Litteenä funktion kuvaaja arvolla  $a = \frac{1}{2}$ .





mod-funktio antaa jakolaskun jakojäännöksen. Koska tämä on  $= 0$ ,  
luku on jaollinen 5:llä.

Tehtävä 13


$poly:=2\cdot x^4-x^3+x^2-x-1$	$2\cdot x^4-x^3+x^2-x-1$
$factor(poly,x)$	$(x-1)\cdot(2\cdot x+1)\cdot(x^2+1)$
$cFactor(poly,x)$	$(x-1)\cdot(x+i)\cdot(x-i)\cdot(2\cdot x+1)$
[]	

Funktio factor jakaa polynomin mahdollisimman matalaa astetta oleviin reaalisiin tekijöihin. (Funktio cFactor vastaavasti kompleksisiin tekijöihin.)

Tehtävä 14

Define $f(x)=\cos(x)$	<i>Valmis</i>
Define $g(x)=1-\frac{x^2}{2}$	<i>Valmis</i>
Define $h(x)=f(x)-g(x)$	<i>Valmis</i>
Define $h1(x)=\frac{d}{dx}(h(x))$	<i>Valmis</i>
Define $h2(x)=\frac{d}{dx}(h1(x))$	<i>Valmis</i>
$h2(x)$	$1-\cos(x)$
$h1(x)$	$x-\sin(x)$
$h1(0)$	0
$h(0)$	0
$maxkoha1:=fMax(h(x),x,-\pi,\pi)$	$x=-\pi$ or $x=\pi$
$minkoha1:=fMin(h(x),x,-\pi,\pi)$	$x=0$ .
$maxarvot:=\{h(-\pi),h(\pi)\}$	$\left\{\frac{\pi^2}{2}-2,\frac{\pi^2}{2}-2\right\}$
$maxarvot \rightarrow$ Decimal	$\{2.9348,2.9348\}$
$\int_{-\pi}^{\pi} (h(x)) dx$	$\frac{\pi \cdot (\pi^2 - 6)}{3}$
$\frac{\pi \cdot (\pi^2 - 6)}{3} \rightarrow$ Decimal	4.05224

{}



Muodostetaan funktioiden erotus  $h(x) = f(x) - g(x)$  ja tämän ensimmäinen ja toinen derivaatta  $h_1(x)$  ja  $h_2(x)$ . Koska  $h_2$  on  $\geq 0$  ja  $= 0$  vain erillisissä pisteissä, on  $h_1$  aidosti kasvava. Koska  $h_1(0) = 0$ , on  $h_1$  negatiivinen, kun  $x < 0$  ja positiivinen, kun  $x > 0$ . Tällöin  $h$  on vähenevä, kun  $x < 0$ , ja kasvava, kun  $x > 0$ . Koska  $h(0) = 0$ , on aina  $h(x) \geq 0$ . Siis  $f(x) \geq g(x)$ , ja  $f(x) = g(x)$  vain, kun  $x = 0$ .

Funktioiden erotuksen suurin arvo eli funktion  $h(x)$  suurin arvo saadaan välin

päätepisteissä. Arvo on  $\frac{\pi^2}{2} - 2 \approx 2.9348$ .


Kuvaajien väliin jäävän alueen pinta-ala saadaan integroimalla:  $\frac{\pi \cdot (\pi^2 - 6)}{3} \approx 4.0522$ .

Litteenä kuvio.

Tehtävä 15

Define $f(x) = x^2$	<i>Valmis</i>
$ympyra := (x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$	$x^2 - 2 \cdot a \cdot x + y^2 - 2 \cdot b \cdot y + a^2 + b^2 = r^2$
$ehdot := \{ ympyra x=t \text{ and } y=f(t), ympyra x=t \text{ and } y=f(-t), ympyra x=0 \text{ and } y=f(0) \}$	$\{ t^4 + (1-2 \cdot b) \cdot t^2 - 2 \cdot a \cdot t + a^2 + b^2 = r^2, t^4 + (1-2 \cdot b) \cdot t^2 + 2 \cdot a \cdot t + a^2 + b^2 = r^2, a^2 + b^2 = r^2 \}$
$kertoimet := solve(ehdot, \{ a, b, r \})$	$r = \frac{t^2+1}{2} \text{ and } a=0 \text{ and } b = \frac{t^2+1}{2} \text{ or } r = \frac{-(t^2+1)}{2} \text{ and } a=0 \text{ and } b = \frac{t^2+1}{2}$
$ymp := ympyra r = \frac{t^2+1}{2} \text{ and } a=0 \text{ and } b = \frac{t^2+1}{2}$	$\frac{t^4}{4} + t^2 \cdot \left(\frac{1}{2} - y\right) + x^2 + y^2 - y + \frac{1}{4} = \frac{(t^2+1)^2}{4}$
$r0 := \lim_{t \rightarrow 0^+} \left( \frac{t^2+1}{2} \right)$	$\frac{1}{2}$
$ymp0 := ymp t=0$	$x^2 + y^2 - y + \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$
$solve(ymp0, y)$	$y = \frac{\sqrt{1-4 \cdot x^2} + 1}{2} \text{ or } y = \frac{-\left(\sqrt{1-4 \cdot x^2} - 1\right)}{2}$
Define $g(x) = \frac{-\left(\sqrt{1-4 \cdot x^2} - 1\right)}{2}$	<i>Valmis</i>
$\frac{d^2}{dx^2} (f(x)) _{x=0}$	2
$\frac{d^2}{dx^2} (g(x)) _{x=0}$	2
[ ]	





Yleiseen ympyrän yhtälöön  $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$  sijoitetaan pisteiden  $O$ ,  $A$  ja  $B$  koordinaatit, jolloin saadaan ehdot, joista kertoimet  $a$ ,  $b$  ja  $r$  voidaan ratkaista.

Ympyrän yhtälöksi saadaan tällöin  $\frac{r^4}{4} + r^2 \cdot \left(\frac{1}{2} - y\right) + x^2 + y^2 - y + \frac{1}{4} = \frac{(r^2 + 1)^2}{4}$  ja

$$\text{säteeksi } r = \frac{r^2 + 1}{2}.$$

Tämän raja-arvo, kun  $r \rightarrow 0$  eli paraabelin kaarevuussäde origossa on  $\frac{1}{2}$ .

Vastaava rajaympyrä on  $x^2 + y^2 - y = 0$  ja tämän alapuoli  $x$ :n funktiona

$$\mathbf{g}(x) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4x^2}}{2}.$$

Dervoimalla saadaan  $\mathbf{f}''(0) = \mathbf{g}''(0) = 2$ , mikä on kaarevuussäteen käänteisarvo.

Litteenä kuvio.